

**Solicitud y consentimiento  
 para utilizar las pastillas  
 anticonceptivas de emergencia  
 (Levonogestrel, Ulipristal Acetate y/o  
 anticonceptivos orales combinados)**

1. Apellido	Primer nombre	Inicial del 2º nombre
2. Número del paciente		
3. Fecha de nacimiento		
	Mes	Día
		Año
4. Raza <input type="checkbox"/> Indio americano o Nativo de Alaska <input type="checkbox"/> Asiático <input type="checkbox"/> Negro o afroamericano <input type="checkbox"/> Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico <input type="checkbox"/> No sabe <input type="checkbox"/> Blanco		
5. Grupo étnico <input type="checkbox"/> Hispano cubano <input type="checkbox"/> Hispano mexicano americano <input type="checkbox"/> De otro grupo hispano <input type="checkbox"/> Hispano puertorriqueño <input type="checkbox"/> No es de origen hispano o latino <input type="checkbox"/> No declarado		
6. Sexo <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino		
7. Condado donde reside		

**Declaración sobre la participación voluntaria y la confidencialidad:** Los servicios cubiertos bajo el Título X se prestan únicamente con la aceptación voluntaria de quienes los reciben. Los individuos que los reciben no deberán estar sujetos a coerción para que reciban dichos servicios, ni para que ellos utilicen o no utilicen un método de planificación familiar en particular. La aceptación de los servicios de planificación familiar no deberá ser un prerrequisito para que el solicitante sea eligible o pueda recibir cualquier otro servicio o asistencia por parte de otros programas, o para participar en los mismos. Esta información es confidencial y será tratada como tal.

Los métodos de control de la natalidad pueden tener efectos beneficiosos o dañinos, o pueden causar complicaciones que pueden ser dañinas para mi salud. He sido informado que los más frecuentes beneficios, riesgos y efectos secundarios son aquellos que figuran a continuación. También podrían ocurrir otros beneficios, riesgos y efectos secundarios que no figuran en la lista.

Beneficios	Posibles riesgos o desventajas	Posibles efectos secundarios
1. Un tratamiento efectivo en un 75 a 89 por ciento para reducir el riesgo de embarazo de 72 a 120 horas después de tener un accidente con un método anticonceptivo o de tener relaciones sexuales sin protección 2. Puede tomarse en cualquier momento durante el ciclo menstrual 3. No provoca el aborto	1. No es efectivo si un óvulo fertilizado se ha implantado en el útero 2. Su efectividad disminuye si han transcurrido más de 120 horas después de tener relaciones sexuales vaginales sin protección	1. Náuseas/Vómitos 2. Cambios en la menstruación 3. Cansancio 4. Dolor de cabeza 5. Dolor abdominal bajo 6. Mareos 7. Dolor de los senos 8. Diarrea
<i>Contraceptive Technology, 20ª ed., 2011</i>		

1. No deseo embarazarme en este momento. Uno de los beneficios de escoger un método anticonceptivo es que podré atrasar el embarazo hasta que lo desee.
2. Entiendo que las pastillas anticonceptivas de emergencia contienen hormonas. Las pastillas deben tomarse luego de tener relaciones sexuales vaginales sin protección, o luego de ocurrir un accidente con un método anticonceptivo durante el tiempo de mi ciclo menstrual en la cual sea muy probable que me embarace. Las pastillas anticonceptivas de emergencia se utilizan únicamente como una medida de emergencia. Entiendo que las pastillas anticonceptivas de emergencia no son un método anticonceptivo, y que no son efectivas como un método anticonceptivo a largo plazo, y que es más efectivo cuando se toma lo antes posible luego de tener relaciones sexuales sin protección.
3. Entiendo que las pastillas anticonceptivas de emergencia funcionan porque impiden que los ovarios liberen el óvulo.
4. Entiendo que las pastillas anticonceptivas de emergencia son efectivas en impedir el embarazo, y que no tienen ningún efecto en un embarazo que ya esté establecido. Entiendo que cuanto más temprana sea la etapa del embarazo, será mayor la probabilidad de que ocurra un error en la prueba del embarazo. Asimismo, entiendo que no se garantiza la precisión de los resultados de la prueba del embarazo, ya sean estos positivos o negativos.

